

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



〈Kyowa-Gifu-Japan〉

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

## 第②類医薬品 かゆみ・虫刺されに (液剤) スクミント EX 液

主成分である酢酸プレドニゾロンエステルは、アンテドラッグと呼ばれる一種のステロイド薬です。アンテドラッグは、皮膚表面の患部に効果を発揮し、体内に吸収されると活性が低下する薬剤です。

湿疹やじんましんなどの炎症を抑制する、酢酸プレドニゾロンエステルおよびグリチルリチン酸二カリウムを、塩酸ジフェンヒドラミン、クロタミトンおよびリドカインと組み合わせて、かゆみを軽減します。

パンテノールは皮膚の修復を促進します。イソプロピルメチルフェノールは殺菌効果があります。l-メントールとdl-樟脳はさわやかな感覚を与え、かゆみを軽減します。

この薬はアルコール類を基剤とする透明な液体で、患部に軽く塗ることで爽快感を与え、肌によくなじみ、素早く乾いて、べとつかず、衣服を汚すこともありません。

### 有効成分 (100mL中の量)

### 使用目的

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル<br>(アンテドラッグステロイドPVA) 0.15g… | 皮膚の炎症を鎮めます   |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g………                             | かゆみの発生を抑える   |
| グリチルリチン酸二カリウム 0.3g…                              | 炎症を鎮める       |
| クロタミトン 5.0g………                                   | かゆみを抑える      |
| リドカイン 2.0g………                                    | 局所麻酔でかゆみを抑える |
| パンテノール 1.0g………                                   | 皮膚の修復を促進する   |
| イソプロピルメチルフェノール 0.1g…                             | 殺菌成分         |
| l-メントール 3.5g………                                  | 清涼感を与える      |
| dl-カンフル 1.0g………                                  | 清涼感を与える      |

## 有用性

虫刺され、かゆみ、湿疹、皮膚炎、発疹、じんましん、あせもの緩和。

## 警告

### [使用を避けること]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水疱瘡、水虫、たむしなどで患部を患っている人または患部が化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周り、粘膜など。

#### 2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

#### 3. 長期連続して使用しないでください。

### [相談すること]

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠中の女性または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広い範囲にある人。
- (5) 患部が湿潤またはただれのひどい人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| 関係部位   | 症状                                       |
|--------|------------------------------------------|
| 皮膚     | 発疹・発赤、かゆみ腫れ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感。        |
| 皮膚(患部) | 水虫(白癬)・トリコモナスによる鼠径部の白癬、にきび、化膿性症状、持続的な刺激性 |

#### 3. 5～6日使用しても症状が改善しない場合は、薬の使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

## 用法・用量

1日に数回、患部に適切な量を塗ります。

### **〔用法・用量に関する注意〕**

- (1) キャップを外し、スポンジ部分を肌に1～2回軽く押し充てて、スポンジに薬液を染み込ませた後、ご使用ください。
- (2) 用法と用量を厳守してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。目に入った場合は、直ちに水かぬるま湯で洗ってください。
- (5) 外用のみに使用してください。

### **保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 火のそばに近づかないでください。また、使用後は火に投入しないでください。
- (5) 揮発性のため、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6) 本剤の着いた手で目や粘膜に触れないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリ、衣類、プラスチック、皮革製品、床や家具などの塗装面は、劣化や変色する可能性があるため、付着しないように注意してください。
- (8) 使用期限が切れた製品は使用しないでください。開封後は使用期限内であってもできるだけ早くお使いください。

### **添加物:**

ジブチルヒドロキシトルエン、1,3-ブチレングリコール、エタノール、クエン酸無水物、クエン酸Na水和物。

### **質問やコメント**

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（週末、祝日を除く）

**〔限定対応のお願い〕**

**<Kyowa-Gifu-Japan>**

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

### **免責事項**

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。