

(表面より続く)

症状の名称	症 状
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 4.5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

下記の用量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
12歳以上15歳未満	2/3包	
12歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量(3包)中、次の成分を含有します。

成 分	分 量
アセトアミノフェン	300mg
エテンザミド	700mg
無水カフェイン	75mg
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg

成 分	分 量
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
カンゾウエキス(原生薬換算量)	250mg(1,000mg)
地竜乾燥エキス(原生薬換算量)	77.92mg(600mg)
キキョウ末	600mg
ショウキョウ乾燥エキス(原生薬換算量)	45mg(450mg)
ケイヒ末	150mg

添加物として、乳糖、アスパルテーム、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号