

肩・腰・関節の

痛みに

効きめの成分が直接浸透

肩・腰・関節の

痛みに

効きめの成分が直接浸透

フェルピナク3.0%
L-メントール6.0%配合



ティアンテロンFB
プレミアムゲル 50g 第2類医薬品

フェルピナク3.0%
L-メントール6.0%配合

ティアンテロンFB
プレミアムゲル

第2類医薬品

ティアンテロンFBプレミアムゲルは、痛みや腫れのもとに直接作用するフェルピナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口：
協和薬品工業株式会社
お客様相談室
☎058-246-8771
受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

副作用被害救済制度
☎0120(149)931

セルフメディケーション
税 控 除 対 象



火気厳禁
第二石油類 危険等級Ⅲ

成分・分量 100g中

成分	分量
フェルピナク	3.0g
L-メントール	6.0g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g

添加物：プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、エチル酸Na、ジソプロピルアルコール

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日2~4回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- 定められた用法を守ってください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

保管及び取扱い上の注意

- 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 本剤を火気に近づけないでください。又、使用後は火中に投げないでください。
- 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であっても、なるべく早く使用してください。

開封口

50g

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎薬
販売名：ティアンテロンFBプレミアムゲル

第2類医薬品

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないでください

🗨️相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

紙 : 箱

製造番号 使用期限



2301-AHI