テシトンHRクリーム

第②類医薬品

さらっとしたベタつかないクリームタイプ

テシトンHRクリーム

抗炎症成分 PVA 配合

皮膚疾患治療薬

第②類医薬品

汗などによる かゆみ、しっしん、かぶれ に効く

20g

使用期限

製造番号

4 962307 090862

紙

1

M004

チューブの開け方

キャップを裏返して差しこむ

消炎作用

かゆみ止め作用

殺菌作用

3つの作用で

がまんできない症状を抑えます。

さらっとしたベタつかないクリームタイプ

テシトンHRクリーム

第②類医薬品 20g

A3203

セルフメディケーション 税控除対象

皮膚患部で よく効き 体内では低活性

がまんできない

あせも かぶれ に

● 着色源化のため、ケースが添付文書を兼ねています。ご使用に際してこのケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンHR クリーム

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水疱(水ぼうそう)、かぎむし・たむし等ヒフが崩れている患部。
(2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

相談する こと

1. 次のA)は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などにかぶれを一症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	かぶれ、ただれ等の白濁、ただれ症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、ひふましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目にふれないように注意してください。万一目にふれた場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量

(100g中) プルゲニソロン酢酸エステル併酸エステル(PVA) 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、l-メントール 3.5g、dl-カンフル 1.0g、ロクタミドン 5.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、ヒドロタルコイト、シメチコン、ジブチルヒドロキシトルエン を含有します。

保管及び取扱いに の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気や少ない涼しいところに密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かないところに保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)。(4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5) メガネ、時計、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面に付着すると変質するとかがいますので、付着しないようご注意してください。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

販作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきます。お客様相談室 ☎058-246-8771

協和薬品工業株式会社

製造販売元

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

消費者相談窓口:協和薬品工業株式会社 お客様相談室

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

テシトンHRクリーム

第②類医薬品