C132

テシトンMZ クリーム

第②類医薬品

●各資源化のため、ケースが添付文書を兼ねています。ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンMZクリーム　第②類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(みずぼうそう)、かぶれ・ただれ等又は化膿している患部。
(2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状がみられた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥感、刺激感、熱感、じんじん感
皮膚(患部)	かぶれ・ただれ、膿の白斑、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐにたくさんの清浄な水で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量

(100g中) ブルビニロゾン草酸エステル酢酸エステル(PVA) 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、L-メントール 3.5g、dl-カンフル 1.0g、ブロタゾイン 5.0g、メソロドルメタノフタリエノール 0.1g、添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ワセリン、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、ジメチルポリシロキサン、ジイソプロパノールアミン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチ