

製品説明書

【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮咳去痰薬

(カプセル剤)

ノスポール鎮咳カプセル

ノスポール鎮咳カプセルは、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルアフェドリン塩酸塩、ノスカピン、グアイフェネシンの鎮咳去痰成分を配合したカプセル剤です。つらいせき・痰の症状を改善します。

有効成分 (6カプセル中/一日量)

使用目的

ジヒドロコデインリン酸塩 18.0mg	鎮咳薬
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40.0mg	気管支拡張薬
ノスカピン 60.0mg	咳き止め薬
クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg	抗ヒスタミン薬
グアイフェネシン 300.0mg	去痰薬
無水カフェイン 150.0mg	頭痛薬

有用性

次の呼吸機能症状の緩和：咳とたん

警告

12歳未満の小児には使用しないこと。

〔使用を避けること〕

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬など）

- 2 この薬を服用した後に車を運転したり機械を操作したりしないでください。(眠気、かすみ目、目のまぶしさなどの症状が発生することがあります。)
- 3 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 4 過量服用・長期連用をしないでください。

【相談すること】

- 1 次の人は、この薬を使用する前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談する必要があります。
 - (1) 医師から治療を受けている人。
 - (2) 妊娠中の女性または妊娠している疑いのある女性。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱・排尿障害
 - (6) 次のように診断された人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症。
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器系	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻出血、歯茎の出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。

無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。
呼吸器抑制	息切れ、息苦しさなどがあらわれる

- 3 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

便秘、口に渴き、眠気

- 4 5～6回服用しても症状がよくない場合は、薬の服用を中止して、この添付文書を使用して医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

用法・用量

次の量を食後にそのまま水またはぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
12歳以上15歳未満	1カプセル	
12歳未満	服用しないこと	

[用法・用量に関する注意]

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) カプセル剤の取り出し方

下図のように、カプセルが入っているPTPシートの突起を指先で強く押し、裏面のアルミシートを破って取り出して服用してください。

(誤ってPTPシートを飲み込むと、食道粘膜に刺さるなどの思わぬ事故につながります)



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

添加物:

バレイショデンピン、乳糖、セルロース、カロメロースカルシウム、ヒプロメロース、赤色2号、赤色102号、カプセル本体にゼラチン、青色1号、赤色102号、ラウリル硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム。

質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト (www.kyowa-ci.co.jp) に掲載されています。

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。