

133.0

40.0

22.0

M001

1

製造番号
使用期限



frecrea cream

フリクレアクリーム 20g

非ステロイド剤

痒み・かぶれに
すぐ効く

第2類医薬品 殺菌効果



一日1回
適量を患部に塗布

この症状にフリクレアクリームで早くかゆみを鎮めましょう
● 下着かぶれ
● 生理時のかゆみ
● おりものよるかゆみ
● 陰部周辺部のかゆみ
● その他のかゆみ
● 汗疹

A2803

快適使用感!
かゆみ・かぶれに
すぐ効く

フリクレアクリームの
かゆみ・かぶれに
かゆみ止め治療薬

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 フリクレア クリーム 第2類医薬品
(かゆみ止め治療薬)

△ 使用上の注意

×してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと: カンジダ症の人
2. 次の部位には使用しないこと: 目の周囲、粘膜など

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

Table with 2 columns: 関係部位, 症状. Rows: 皮膚 (発疹・発赤、かゆみ、はれ)

● 効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

● 成分・分量(100g中)

Table with 2 columns: 成分名, 分量. Rows: リドカイン (2.0g), トコフェロール酢酸エステル (0.3g), ジフェニヒドラミン塩酸塩 (2.0g), イソプロピルメチルフェノール (0.1g)

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、ステアリアルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミンを含有します

● 用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

● 用法・用量に関連する注意

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。
(5) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けてください。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

● ご注意

カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による根本治療が必要です。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お問い合わせ先へご連絡ください。お問い合わせ先は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 0120-468-771
受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目6番6号

かゆみ止め治療薬
フリクレアクリーム

第2類医薬品

かゆみ止め治療薬
フリクレアクリーム

第2類医薬品

Table with columns: 品名, 本コード, 仮コード, 制作日, MC, 色, スミ, C, ピンク, Y, コンアイ, トラップ. Includes barcode and company information.