

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするとせき・ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	3 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)錠剤の取り出し方(PTP品)
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながります。)



成分・分量

1日量(9錠)中に次の成分を含有します。

成 分	分 量	働 き
イブプロフェン	450 mg	熱を下げ痛みをおさえる
プロムヘキシン塩酸塩	12 mg	のどにからんだたんを出しやすくする
クレマスチンフマル酸塩 (クレマスチンとして)	1.34 mg(1 mg)	かぜのアレルギー症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)をおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	24 mg	せきをすめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	せきをすしめ、たんをおさえる
無水カフェイン	75 mg	頭痛をやわらげる
カンゾウ乾燥エキス(原生薬換算量)	190 mg(950 mg)	炎症をおさえる
アスコルビン酸カルシウム	500 mg	ビタミンCの補給
チアミン硝化物	25 mg	ビタミンB ₁ の補給
リボフラビン	12 mg	ビタミンB ₂ の補給

添加物として、乳糖、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、ステアリン酸Mg、マクロゴール、タルク、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、クロスCMC-Na、ヒプロメロース、酸化チタン、三酸化鉄を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(びん入品)(5)びんのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。(びん入品)(6)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。)(7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号