C253

MOREFINE 軟膏タイプ

しっしん 皮膚炎・かぶれ

しっとりした塗り心地 軟膏タイプ〔20g〕

8つの成分がすばやく効く 軟膏タイプ

虫さされ　あせも　じんましん

■8つの成分がすばやく効く

■PVAステロイド基準内最大量配合※

MOREFINE

モアファインPVA軟膏　セルフメディケーション税控除対象　第②類医薬品

※鎮痒消炎薬製造販売承認基準の最大量配合

チューブの開け方
キャップを裏返して差しこむ

A2502

1

使用期限

製造番号

4 962307 600399

紙

M023

MOREFINE 軟膏タイプ

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 モアファインPVA軟膏　第②類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

⚠使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、あせも・ただれ等又は化膿している患部。
(2)目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、じんじん感
皮膚(患部)	あすむし・ただむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目にスらないように注意してください。万一、目にスった場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中)アルバニシリロン草酸エステル酢酸エステル(PVA) 1.5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、ロタミン 50mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、グリチルレチン酸 5mg、フラジトイン 2mg、リバカイン 20mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、マクロゴール、エンタ酸水和物を含有します。

保管及び取扱いしの注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)。(4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの店又は下記までご連絡ください。
薬剤師・登録販売者(薬剤師)が直ちにお答えします。
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土,日,祝日を除く)

副作用救済制度 ☎0120-149-931