

ラカサウ-ク

2.08	リドカイン
0.38	トコフェール酢酸エステル
2.08	ジフェニルプロピオン塩酸塩
0.18	イソプロピルメチルノール

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

この子一人を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ、はれ

⚠ 使用上の注意

販売名 ヲカナウS
〈かいゆみ止め治療薬〉

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



かゆみ・かぶれに

ベタつかないクリームタイプ

- ❁ 生理時のかゆみ
- ❁ おりものによるかゆみ
- ❁ 汗ムレによるかゆみ
- ❁ 下着かぶれ
- ❁ 陰部周辺部のかゆみ
- ❁ その他の炎症・かゆみ・かぶれなど

 1日数回
適量を患部に塗布

白色クリーム

チェーザの開け方
キヤッパを裏返して
差し込む

ラカナウスクリーム

非ステロイド剤

第2類医薬品

逆もどりにくい アルミチューブ

20 g

開封□



使用期限

製造番号