



105.0

35.0

40.0

鎮痒消炎剤 第②類医薬品

新テシトンEX ゴールド液

【特徴】

1. 8つの有効成分が、つらい頭皮のかゆみ、湿疹に効きます
2. プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（アンテドラッグステロイド）配合
3. l-メントール配合でスーッと爽やかな使い心地です
4. 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口：
協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎0120-468-771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



目には入れないこと

火気厳禁
第二石油類、危険等級Ⅲ
(エタノール、マクロゴール)

製造 協和薬品工業株式会社
販売元 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号



4 962307 092149

A2710

使用期限
未開封

大容量 30mL

頭皮などの
かゆみ
かぶれに

新テシトンEXゴールド液



頭皮に直接塗れる

ピンポイントタイプ

頭皮などの
かゆみ
かぶれに

目には入れないこと

新テシトンEX
ゴールド液

30mL

第②類医薬品

1

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

【販売名】 新テシトンEXゴールド液
【効能・効果】 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ
【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し内服しないでください。(5) 患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。

【容器の使用法】 (1) 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を 2～3 回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)(2) 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)(成分・分量) (100mL中) プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA) 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、クロタミトン 3.0g、グリチルリチン酸ニカリウム 0.2g、l-メントール 3.5g、リドカイン 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、アラントイン 0.2g 添加物として、1,3-ブチレンジグリコール、マクロゴール、エタノール、リン酸、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(5) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、プラスチック類、化繊の衣類、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないようご注意ください。(6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。(7) 使用後はキャップをしっかりと締めてください。(8) 使用期限 (箱底面に記載) を過ぎた製品は使用しないでください。

使用上の注意

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

☒ 相談すること

次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。(5) 湿疹やただれのある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



PVA配合

アンテドラッグ型抗炎症成分

湿疹

かぶれ

かゆみ

頭がかゆくて
つらい方に

すばやく炎症を抑える
患部の炎症を鎮める

第②類医薬品

30mL

品 名	新テシトンEXゴールド液 30mL 個箱	制 作 日		MC	色 調	スミ	C	M	Y	コンアイ	トラップ
		2015.10.5		石崎						PAN2738	()
		校	作業者印	AC		キ	シロ(正)	シロ(副)	フキギンズリ	UVコート	角度
本コード	1293-1123-50	校	作業者印	AC	調						
仮コード	1293P0602099	6 校	石崎	確井		確井	朝日印刷株式会社		mwug5	APP.MA	