

製品説明書

【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

(錠剤)

施 君 力 U . P

施君力U.Pは、オキソアミジン末(においを抑えたニンニク製剤)、人参乾燥エキス(オタネニンジン(人参)の根)、イカリソウ乾燥エキス(淫羊藿の全草)、カシュウ乾燥エキス(つるどくダミの塊根)の強壮生薬にビタミン、アミノ酸等を配合したビタミン含有保健薬です。

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・かぜなどの発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給に効果をあらわします。

日ごろの仕事やストレスなどにより疲れを感じた時、からだの疲れが抜けない時、体力の衰えが気になる時など広くご使用になれます。

有効成分 (4錠中/一日量)

使用目的

オキソアミジン末 120mg		滋養強壮効果のある生薬成分 (原生薬換算量 12,000mg)
L-アルギニン塩酸塩 150mg		アミノ酸の補給
人参乾燥エキス 72mg		滋養強壮効果のある生薬成分 (原生薬換算量 720mg)
イカリソウ乾燥エキス 60mg		滋養強壮効果のある生薬成分 (原生薬換算量 600mg)
カシュウ乾燥エキス 36mg		滋養強壮効果のある生薬成分 (原生薬換算量 360mg)
ウルソデオキシコール酸 12mg		胆汁成分の補給
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20mg		ビタミン E の補給
ガンマ-オリザノール 10mg		ガンマ-オリザノール の補給
チアミン硝酸化物 10mg		ビタミン B1 の補給

リボフラビン 6mg ビタミン B2 の補給

ニコチン酸アミド 25mg ニコチンアミド の補給

無水カフェイン 50mg 活力成分

有用性

- 滋養強壮。
- 虚弱体質。
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振、栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

警告

[相談すること]

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 一か月くらい服用しても症状がよくなりえない場合は、服薬を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
5. 服用後、生理は予定より早くきたり、月経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長期間続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売業者に相談してください。

用法・用量

次の量を朝夕食後かまずに服用して下さいください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
15歳未満の子供	服用しないこと	

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これはこの本剤中のリボフラビンリン酸エステルによるもので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、濡れた手で錠剤に触れないでください。
- (5) びんの中の詰め物は錠剤が輸送中に壊れるのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので、取り除いてください。
- (6) びんの中の「紙包み」は乾燥剤です。覆われた紙を取り除かないでください、そして決して取り出したり、開いたり、食べたりしないでください。
- (7) 箱の内蓋の「開封年月日」欄に開封日を記入して下さい。
- (8) 期限切れの製品を服用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持のため6ヶ月以内に服用して下さい。

添加物:

セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、酸化チタン、黄色5号、カルナウバロウ。

質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口： 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（週末、祝日を除く）

【限定対応のお願い】

＜Kyowa-Gifu-Japan＞

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト

免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。