第②類医薬品

ベタつかないさらっとしたクリームタイプ

テシトンフェクトプラス

抗炎症成分 **PVA** 配合

皮膚疾患治療薬 **8つの成分**がすばやく効く クリームタイプ **12g**

がまんできない

湿疹、かゆみ 皮膚炎に

じんま疹 あせも 虫さされ かぶれ

皮膚患部でよく効き 体内では低活性

セルフメディケーション 税 控除対象

●皮膚炎 ●あせも ●かぶれ ●じんま疹

消炎作用 **かゆみ止め作用** **殺菌作用**

3つの作用で
がまんできない症状を抑えます。



A3002

4 962307 091180

使用期限

製造番号

1

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシトンフェクトプラスクリーム 第②類医薬品

〈皮膚疾患治療薬〉

⚠使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
   (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
   (2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
   (1) 医師の治療を受けている人。
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
   (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   (4) 患部が広範囲の人。
   (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

（1g中）プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA） 1.5mg、グリチルレチン酸 5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、クロタミトン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エデト酸Na、パラベン、リン酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります。）。(4) 使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社
お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00
（土、日、祝日を除く）

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

テシトンフェクトプラス 第②類医薬品

テシトンフェクトプラス 第②類医薬品